

Die Gattung *Adromischus* Lem Eine Übersicht

Von H. Jacobsen

Familie: *Crassulaceae*.

Heimat: SW-Afrika, Cape Province.

Sukkulente Stauden oder kleine Sträucher, die Stämmchen häufig mit bald absterbenden und verbleibenden Luftwurzeln; Blätter meist wechselständig oder kreuzgegenständig, teils rosettig gestellt, verschieden gestaltig, flach oder rundlich oder auch keulenförmig, z. T. am Ende verbreitert, sitzend oder in den kurzen Stiel verschmälert, meist kahl, bei einigen Arten fein behaart, grün, bei einigen Arten dunkelpurpurn gefleckt; Schaft endständig, oft kurz und mit nur einer Blüte, sonst verlängert, meist unverzweigt oder gegabelt, seltener mehr verzweigt, der Blütenstand traubig, fast ährig; Blüten aus den Achseln von Hochblättern, aufrecht bis abstehend, selten hängend, sehr oft mit sehr kurzem Stielchen, Kelchzipfel sehr kurz, Kronenröhre eng, schlank, kaum oder nicht bauchig erweitert, die Zipfel vereint oder eingeschnitten, sehr kurz, zuerst abstehend, später zurückgebogen, Blütenfarbe weißlich oder rötlich, Blütezeit im Sommer.

Im Jahrbuch der Schweizerischen Kakteengesellschaft, „Sukkulenteenkunde“ VII/VIII, 1963, S. 130, bringt A. J. A. UITEWAAL eine ausge-

zeichnete Zusammenfassung der bisherigen systematischen Arbeiten über die Gattung *Adromischus* Lem. Demnach wurde die Gattung *Adromischus* Lem. schon von CHARLES LEMAIRE 1852 von *Cotyledon* abgetrennt, was bis 1900 völlig übersehen, aber von A. BERGER wieder eingeführt wurde. Die oben gegebene Beschrei-

Adromischus-Blütenstände. links: „*Incisilobatae*“ Uitew.; rechts: „*Connatilobatae*“ Uitew. Reprod.: Sukkulenteenkunde (Schweiz.) VII/VIII, 1963, S. 131. Phot. A. J. A. Uitewaal

