



II. Sektion *Adromischus* (*Longipedunculati* v. Poelln.)

Schaft verlängert, selten kurz; Blüten zahlreich, ± sitzend bis gestielt, aufrecht bis abstehend, bei einer Art hängend (*Adromischus phillipsiae* [Marl.] v. Poelln.), der Blütenstand ährenförmig, traubig bis selten rispig; Sprosse oft etwas verlängert; Pflanzen größer, Blätter zahlreicher und größer.

1. Subsektion *Cristati* (Schoenl.) v. Poelln. (*Cotyledon* L. Sekt. *Spicatae* Harv. Subsekt. *Cristati* Schoenl.)

Blätter mit feinen Haaren bedeckt.

Leitart: *Adromischus cristatus* (Haw.) Lem.

Arten:

- Adromischus cristatus* (Haw.) Lem.
- poellnitzianus* Werd.
- schoenlandii* (Phillips) v. Poelln.
- zeyheri* (Harv.) v. Poelln.

2. Subsektion *Hemisphaerici* (Schoenl.) v. Poelln.

(*Cotyledon* L. Sekt. *Spicatae* Harv. Subsekt. *Hemisphaericae* Schoenl.; *Cotyledon* L. Sekt. *Paniculatae* Schoenl. Subsekt. *Caryophyllaceae* Schoenl. p. part.)

Blätter kahl, nur in der Jugend mit wenigen Haaren bedeckt.

Leitart: *Adromischus hemisphaericus* (L.) Lem.

Arten:

- Adromischus alstonii* (Schoenl. et Bak. f.) C. A. Smith
- alveolatus* P. C. Hutchis.
- bicolor* P. C. Hutchis.
- blosianus* P. C. Hutchis.
- bolusii* (Schoenl.) Bgr.
- caryophyllaceus* (Burm. f.) Lem.
- clavifolius* (Haw.) Lem.
- cooperi* (Bak.) Bgr.
- festivus* C. A. Smith
- fragilis* P. C. Hutchis.
- geyeri* P. C. Hutchis.
- grandiflorus* Uitew.
- halesowensis* Uitew.
- hallii* P. C. Hutchis.
- hemisphaericus* (L.) Lem.
- juttae* v. Poelln.
- kesselringianus* v. Poelln.
- kubusensis* Uitew.

Adromischus pauciflorus (links oben) P. C. Hutchis. *Reprod.: Cact. a. Succ. Journ. Am. XXXII, 1960, S. 62.*

Phot. P. C. Hutchison

Adromischus pulchellus (links unten) P. C. Hutchis. *Reprod.: Cact. a. Succ. Journ. Am. XXXI, 1959, S. 120.*

Phot. P. C. Hutchison