


Lichaam enkel, platrond, tot 4 cm diam., tot 2,5 cm hoog, midden- tot donkergroen. **Ribben** tot 24, opgelost in ronde, vlakke, tepelvormige knobbeltjes van 6 mm diam., meestal rood- tot violetachtig. **Areolen** ovaal, met ivoor-achtig vilt. **Dorens** iets gebogen, kamvormig, stralend zijwaarts gesteld, aan weerszijde 5, onderaan 1, bovenaan 1 (—2); zelden 1 middendoren, alle iets ruw, witachtig kleurloos. **Bloem** trechtervormig, 30 mm lang en breed, citroengeel. **Pericarpellum** 8 mm lang, 5 mm breed, onderaan kaal, verder met bruine borstels en witte haren. **Receptaculum** 5 mm lang, met bruine borstels en witte haren. **Buitenste perianthbladeren** spatelvormig, met naaldfijne punt, vuilgeel met groene strepen; **binnenste** spatelvormig, spits, fijn gewimperd, licht citroengeel. **Stijl** 10 mm lang, lichtgeel. **Stempels** 5, 3 mm lang, geelwit. **Primaire meeldraden** 9 mm lang, rond stijl ingeplant, lichtgeel; **secundaire** 5-7 mm lang, lichtgeel. **Helmknopjes** 1 mm lang, geel. **Nektarruimte** 0,5 mm breed, open. **Zaadholte** 5 mm lang, 2,5 mm breed. **Vrucht** rond, 7 mm diam., met lichtbruine borstels en witte haren. **Zaad** mutsvormig, donkerbruin, mat glanzend, 1,7-1,9 mm lang, zeer kort en fijn behaard; **testa** met zeer kleine vrijwel vlakke bultjes. **Groeiplaats** Paraguay, bij Ytá-Ybaté, zuid oost van Asunción.

Echeveria shaviana walther ined

J. C. VAN KEPPEL

Van de nieuwe Echeveria-aanwinsten der laatste jaren is deze soort ongetwijfeld de meest opvallende verschijning voor de liefhebbersverzamelingen.



Echeveria shaviana

Foto Buining

In een tijdsbestek van enkele jaren is zij over de gehele wereld verspreid en tot een van de meest begeerde vetplanten geworden voor de gespecialiseerde verzamelaars. Interessant is het op te merken dat deze, reeds zo bekende plant, officieel niet bestaat. Tevergeefs zal men haar dan ook zoeken in het zojuist verschenen "Sukkulenten Lexicon" van Jacobsen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat de bekende reeds in 1959 gestorven Echeveriakenner Eric Walther, deze plant beschreef in zijn nog steeds niet uitgegeven monografie van het geslacht Echeveria. De naam is bekend geworden door de "I.S.I. Plantlist", die regelmatig gepubliceerd wordt in het Amerikaanse succulentenorgaan. De I.S.I. (International Succulent Institute) is een van de niet-commerciële organisaties in Amerika, die zich bezighouden met het verspreiden van succulenten afkomstig van de oorspronkelijke groeiplaatsen, of directe nakomelingen daarvan. In 1967 kreeg ik enkele blaadjes afkomstig van een I.S.I.-plant, via mijn Engelse succulentenvriend Mr. Ron Ginns. De bij dit artikel afgebeelde plant is uit één van deze blaadjes opgegroeid en bloeide reeds in 1969! Ze is zowel door middel van zaaien als door bladstek gemakkelijk te kweken. Zelfs de kleine bladeren van de bloemstengel kunnen voor de vermeerdering dienst doen. Deze mooie, kleinblijvende Echeveria met haar prachtige blauwberijpte, wit of rose-gerande, gegolfde bladeren is een sieraad voor iedere verzameling. Zij werd door F. Harrison gevonden, groeiend op rotsen in dennebossen bij Tamaulipas, Mexico.

Onder de foutieve naam E. 'Shazan' worden in Engeland planten verspreid, die enigszins afwijken van het hier beschreven type. De blaadjes zijn smaller en verkleuren bij zonnige cultuur fraai rose. In Australië wordt dit type verspreid onder de naam "Pink Shaviana".

Echeveria shaviana behoort tot de groep Pruinosaes Walth. In de hoop dat Walther's monografie eens in druk zal verschijnen, zal ik (evenals anderen) de naam van deze Echeveria niet valideren.

De beschrijving, naar planten in mijn collectie, is als volgt:

Plant stamloos of met korte stam, soms spruitend aan de basis; rozetten 7 - 10 cm in diam., dicht bebladerd (20 - 40 bladeren). Bladeren kaal, omgekeerd ei-spatelvormig, 4,5 cm lang, 2,5 cm breed aan de top, 6 mm breed aan de basis; bovenzijde enigszins uitgehold, onderzijde convex; met rose of witte, doorschijnende randen, gegolfd-gekarteld in het bovenste deel, grijsgroen, sterk blauwachtig berijpt, soms rose verkleurend, top met scherpe spits, enigszins opgebogen. Bloemstengel tot pl.m. 30 cm lang, rechtop staand, bruin-grijs-witachtig, 6 mm dik aan de basis, bladeren omgekeerd langwerpiglancetvormig, rechtop afstaand, de grootste 2 cm lang, 6 mm breed, wit gespoord, randen glad of iets gegroefd, grijsgroen, 10-18 bladeren tot aan de eerste bloem. Schutbladeren kleiner, pl.m. 12 mm lang. Bloeiwijze een schicht (cincinnus) met 20-30 bloemen. Deze zijn scherp gekield, 12 mm lang, 6 mm breed aan de basis, toppen weinig uitstaand; kleur buitenzijde neyron rose (R.H.S.C.C. 55b; H.C.C. 623/1), enigszins berijpt, binnenzijde burnt orange (R.H.S.C.C. 31b; H.C.C. 014/1); kelkbladen opstijgend, priemvormig, blauwgroen, diep ingesneden, 4-13 mm lang, zeer ongelijk, bovenzijde vlak, onderzijde convex, bloemsteeltjes 2-3 mm lang, vruchtbladen witachtig, stempel groen, meeldraden rose. Bloeitijd juli - augustus.

Summary: Discussed is Echeveria shaviana Walther ined., also occurring in English collections under the names E. 'Shazan' and 'Pink Shaviana'. I do not valid the specific epithet of E.shaviana, doing honour to Eric Walther, and hoping that his unpublished monograph will be printed in the nearest future.