

Kalanchoe grandidieri Baillon var. *itampolensis* Descoings var. nov.

A *Kalanchoe grandidieri* var. *grandidieri* differt inflorescentia breve, 15-20 cm longa, ramis lateralibus longis cymas multifloras ferantibus, corollae lobis longe acuminatis.

Type : Phillipson & al. n° 3733 [holo-, P ; iso-, MO] ; sud-ouest de Madagascar, Toliara, nord d'Itampolo.

Étymologie : l'épithète spécifique rappelle la localité d'origine de la variété, le village d'Itampolo.

Description

Inflorescence terminale, dressée, ramifiée ; pédoncule et rachis jusqu'à 20 cm de longueur totale ; pédoncule de 4-5 mm de diam., axes latéraux opposés, horizontaux, de 5-20 mm de long, de \pm 3 mm de diam., portant chacun une cyme dense de 7-9 fleurs.

Lobes de la corolle terminés par un net acumen, de 1-1,5 mm de long, aigu, retourné vers l'extérieur.

Matériel étudié :

- Léandri 4085 : 0,80-1 m, entre Efoetsy et Itampolo près de la côte sud-ouest, au sud du lac Manampetsa. Alt 10-20 m. 27-11-1960 (fr).
- Phillipson & al. 3733 : Toliara, 15 km N of Itampolo ; bottom of escarpment of calcareous plateau. 24°33'S 43°56'E, 50 m. Bushy shrub to 2,5 m ; leaves pale grey-green ; inflorescence erect : sepals dry ; petals mauve, fleshy ; filaments white, anthers pale yellow ; ovary pale green, styles mauve. 09 october 1990. (Type).

Distinction :

- var. *grandidieri* : inflorescence longue (jusqu'à 50 cm), formée d'un axe unique portant de petites cymes subsessiles ; lobes de la corolle à sommet aigu non acuminé ;
- var. *itampolensis* : inflorescence courte (15-20 cm), ramifiée, à rameaux latéraux longs portant des cymes multiflores ; lobes de la corolle à long acumen révoûté.

Les deux variétés sembleraient avoir des aires distinctes mais très proches : les environs de Tuléar (La Table, l'Onilahy, Saint Augustin) pour la variété *grandidieri*, les environs d'Itampolo, au sud du lac Tsimanampetsa, pour la variété *itampolensis*.