

× *Graptopetalia* cv. 'Caerulescens' (Gossot)

Echeveria caerulescens Gossot in Notre Vallée 24-25 : 36 (1938)

Graptopetalum paraguayense × *Echeveria elegans*

Deze, door Gossot tot het geslacht *Echeveria* gerekende plant, die wij gedurende een aantal jaren in onze collectie geobserveerd hebben, is naar onze mening ongetwijfeld een *Graptopetalia*. Gossot vermeldt slechts, dat een der ouders vermoedelijk *Echeveria weinbergii* (= *Graptopetalum*



Figuur 66

× *Graptopetalia* cv. 'Caerulescens'

Collectie v. Keppel

foto: van Arkel

paraguayense) is, terwijl Jacobsen en Rowley, zich baserend op deze uitspraak, schrijven dat deze plant mogelijk een *Graptopetalia* is. Hieruit kunnen wij concluderen dat zij de bewuste plant waarschijnlijk niet kennen.

De habitus van deze plant is typisch van een *Graptopetalia*: een korte stamvormende plant, die op oudere leeftijd in de bladoksels zijnscheuten vormt. De *Echeveria*-achtige bloemen hebben evenals bij *Graptopetalum*, 5 tussen de bloembladen naar buiten gekromde meeldraden, o.i. een duide-

lijke aanwijzing, dat deze plant een geslachts-hybride is. De rozetvorm, bladkleur, de doorschijnende bladrand en de vorming van luchtwortels wijzen erop dat *Echeveria elegans* aan de totstandkoming van deze hybride heeft meegewerkt. Al deze kenmerken vinden wij aan deze plant terug.

Door de stamvorming is *Graptoveria* cv. 'Caerulescens' misschien minder geschikt voor de handel, maar als jonge „kleurplant” biedt zij o.i. toch wel mogelijkheden. Caerulescens betekent: blauwachtig.

Stekken die in de zomer buiten gekweekt worden groeien vrij gedrongen.

Korte beschrijving: Stam aanvankelijk blauwachtig wit berijpt, later grijs-bruinachtig. Rozet open, tamelijk groot, 10—15 cm doorsnee, later spruitend in de bladoksels. Zijspruiten aanvankelijk verlengd, lang gesteeld.

Bladen omgekeerd eirond-langwerpig, opstaand, later teruggebogen, top spits, ± 7 cm lang, bovenzijde vlak-concaaf, onderzijde convex, gekield, op doorsnee driehoekig, vlezig; kleur blauwachtig, wit berijpt met doorschijnende witte rand, vaak rose verkleurend.

Bloemstengels vrij talrijk, roodachtig groen, nauwelijks berijpt, in het bovenste deel van de plant, enkelvoudig of gevorkt, met kleine, spoedig afvallende schutbladen.

Bloemen ± 13 mm lang, 10—20 in een gevorkte tros, geel aan de buitenzijde soms iets rose, ongevekt; kroonbladen rechtopstaand; 5 teruggebogen meeldraden. Knoppen dik, stomp, zich vaak niet openend, zodat de bloembladen schijnbaar vergroeid lijken; kelkbladen $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ van de bloemkroon. Bloeitijd mei—juni.

Nieuws van de „Phylloclub”

Enkele leden hebben de wens te kennen gegeven mee te doen aan de eerstvolgende importering van Phyllo's. Alle leden die hieraan willen deelnemen worden verzocht, met opgave van naam of bloemkleur, prijsklasse en aantal hun lijst vóór 15 januari 1965 in te zenden aan onderstaand adres. De prijzen per plant van de Innes catalogus variëren van f 2.25 tot f 6.00 + een per plant omgeslagen bijdrage in de kosten. Opgemerkt is dat goedkope planten in cultuur beter zijn dan duurdere planten. De beste tijd voor importeren is het vroege voorjaar.

Thans zijn in het register opgenomen 283 hybriden en 18 botanische soorten.

Door de zeer op prijs gestelde, spontaan aangeboden en met dank aanvaarde medewerking van één van de leden zal binnenkort een afschrift van het register met adressenlijst aan alle leden worden toegezonden. Onderling kan dan contact worden opgenomen voor schenking, ruil of verkoop van stekmateriaal.

Bij een bezoek aan een van de leden zag ik een goed resultaat van het uitgezaaide zaad van botanische soorten dat in „Succulenta” juli 1964 is aangeboden. Bij dit bezoek zijn waardevolle cultuurervaringen uitgewisseld. Denkt u er aan dat dit laatste ook kan geschieden via het „Nieuws van de Phylloclub”.

K. P. VAN ARKEL
Ellekomstraat 12 — 's-Gravenhage.