



GRAPTOPETALUM PACHYPHYLLUM Rose
foto: de Klark.

J. C. VAN KEPPEL

GRAPTOPETALUM

PACHYPHYLLUM Rose

Het geslacht *Graptopetalum* is voor de liefhebber zeer interessant, niet in het minst door zijn botanische kenmerken, reden waarom de systematici met deze groep blijkbaar nog niet goed raad weten. Een en ander werd in een artikel van de hand van de heer Korevaar in *Succulenta* 1958, blz. 97 e.v. reeds uitvoerig toegelicht, zodat wij hier verder niet op ingaan. Op een der door hem terloops genoemde soorten willen wij echter eens de aandacht vestigen, n.l. *Graptopetalum pachyphyllum*, een ideaal plantje voor de liefhebber met beperkte ruimte. Het vormt rozetjes van slechts 1—2 cm doorsnede, waarop in de zomer talloze bloemstengeltjes ontstaan, getooid met een tuiltje van 2—5 radvormig afstaande bloemen. De dicht opeenstaande blauwberijpte rolronde blaadjes zijn bij een goede kultuur fraai wijnrood gekleurd met donkerder spitsje. De stengelblaadjes zijn meestal groter dan de rozetbladeren en vallen tijdens de bloei niet af.

De kultuur is eenvoudig. Hoewel de plantjes op hun natuurlijke groeiplaats in Cadereyta, Queretaro in Mexico in sphagnum (veenmos) voorkomen, groeien zij bij ons in een zanderig humusrijk mengsel goed. Afgevallen blaadjes bewortelen vrij snel, zodat het plantje een kussen vormt van dicht tegen elkaar geplaatste rozetjes zoals bij de bekende *Echeveria amoena*.

Hoewel deze laatste oppervlakkig bezien misschien enige overeenkomst vertoont, zijn de verschillen dusdanig dat verwisseling tussen de beide soorten uitgesloten is. De rozetbladeren van *Echeveria amoena* zijn vlakker, de bloemstengelblaadjes vallen bij de minste aanraking af en de bloem is de typische klokvormige, slechts aan de voet vergroeide *Echeveria*bloem. *Graptopetalum pachyphyllum* heeft bloemen waarvan de bloemblaadjes tot 1/3 vergroeid zijn, de slippen staan radvormig af. De kenmerkende bloedrode vlekjes zijn duidelijk te onderscheiden. De soortnaam *pachyphyllum* betekent dikbladig.

Walther oppert naar aanleiding van deze overeenkomst de veronderstelling dat *Echeveria* en *Pachyphytum* afstammen van vormen die gelijken op die planten, die wij thans als behorend tot *Graptopetalum* beschouwen.

Berger noemt deze soort *Sedum atypicum* en deelt haar in met *Graptopetalum pusillum* Rose (synoniem *Sedum graptopetalum*) en *Gr. paraguayensis* (syn. *Sedum weinbergii*, *Echeveria weinbergii*, *Byrnesia weinbergii*) in de sectie *Graptopetalum* van het geslacht *Sedum*.

Lit.: Dr J. N. Rose in *Addisonia*, Vol. VII, 3, 45, 1922 (met tekening).

E. Walther in *Cactus and Succ. Journal of Amerika*, Vol. V, 12, 592, 1934 (met foto).