


succulenta

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING
VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN



Echeveria
peacockii

foto Buining

48STE JAARGANG
NO. 12
DECEMBER 1970

Echeveria peacockii (Baker) Morren

J. C. van KEPPEL

Als men de afbeelding van deze bijzonder mooie Echeveria beziet, is het onbegrijpelijk, dat dit geslacht heden ten dage zo weinig populair is. Honderd jaar geleden was dat anders en toen de Britse plantenliefhebber Mr. Peacock deze plant op een tentoonstelling inzonderde trok deze grote belangstelling van liefhebbers, kwekers en botanici. Zij was enige jaren daarvoor door de Tsjechische tuinbouwkundige en plantenzieken Benedict Röszi (Roesz) tijdens 'n expeditie in Mexico ontdekt en door J. Croucher, een Echeveriakenner, die de belangrijke collectie van W. W. Saunders verzorgd had, E. peacockii genoemd maar niet beschreven. De auteursnaam Croucher, die algemeen gebruikt wordt, is dus onjuist. Dr. J. G. Baker, auteur van een der beste monografieën over het geslacht Echeveria gaf een duidelijke beschrijving, maar omdat hij Echeveria niet als zelfstandig geslacht erkende, als Cotyledon (Echeveria) peacockii. Als E. desmetiana werd zij in 1874 door de bekende Belgische kweker de Smet in de handel gebracht, terwijl E. subsessilis en E. tenuis, beide door Dr. Rose beschreven, ook tot de synoniemen gerekend moeten worden. E. peacockii is dus nogal variabel, zowel in bladvorm als in de bloemen (kleur, grootte en plaatsing), zodat het niet zo verwonderlijk is dat zij in cultuur ook nog onder andere (foutieve) namen aangetroffen wordt. Met haar witbepoederde, stijve, breed aangehechte bladeren lijkt zij in habitus veel op een Dudleya. De in een dichte rozet geplaatste bladeren zijn langwerpig - spatel-, tot omgekeerd eivormig, 3-7 cm lang, 2-3 cm breed, toegespitst, blauwachtig, wit berijpt en in de bovenste helft vaak rood gerand. De bloemkleur varieert van oranje tot oranjerood. De bloeiwijze is een tweerijige schicht (cincinnus), met dicht opeen geplaatste zittende of zeer kort gesteelde bloemen. De bloemstengel, schut-, kelk- en bloembladen zijn vaak ook prachtig blauw berijpt. Met nog enkele later te bespreken soorten behoort zij tot de groep Pruinosae van Walther's indeling van het geslacht. E. peacockii kan door zaaien of door spaarzaam gevormde zijscheuten vermeerderd worden. Vermeerdering door middel van bladstek is nauwelijks mogelijk. Door aanraking wordt de fraaie waslaag beschadigd en om deze reden verdient het ook aanbeveling de planten niet over de kop te gieten. Volle zon, veel frisse lucht en een matige begieting is vereist om mooie exemplaren van deze soort te kweken.

Literatuur:

- E. peacockii (Baker) Morren in La Belg. Hort. 24 : 283, 1874
- E. peacockii hort. nom. in Gard. Chron. 2, (1) : 674, 1874
- Cot. peacockii Baker l.c. 2 (2) : 258, 1874
- E. desmetiana Morren in La Belg. Hort. 24 : 159, 1874

Rectificatie novemhernummer:

bloeiwijze Echeveria vanvlietii p. 170, te wisselen met bloeiwijze Echeveria rauschii p. 171.