

# succulenta

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING  
VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN



Kalanchoe pumila

Foto: Noltee

54STE JAARGANG  
NO. 7  
JULI 1975

## **Kalanchoe pumila** Baker

J. C. VAN KEPPEL


Het geslacht *Kalanchoe* telt ca. 120 soorten, die voorkomen in de tropische gebieden van Afrika, Azië en Amerika. De groeiwijze van de soorten is sterk uiteenlopend: van zeer lage miniatuurplantjes tot meterslange slingerplanten en struikachtige vormen. Vroeger onderscheidde men drie verschillende geslachten, die thans als secties of ondergeslachten van *Kalanchoe* worden beschouwd; *Kitchingia* met 4 soorten, *Bryophyllum* met 26 soorten en *Eukalanchoe* met ruim 90 soorten. De dankbaarste planten voor de liefhebber vindt men wel in de laatste groep, waartoe onder andere de bekende *K. blossfeldiana*-hybriden behoren die bij duizenden als kamerplant worden verhandeld. Deze maal willen wij een wat minder bekend, maar zeker niet minder mooi plantje, aan u voorstellen, n.l. ***Kalanchoe pumila*** Baker (Syn. *K. brevicaulis* Baker, *K. multiceps* Baker).

*K. pumila* is afkomstig uit Centraal Madagascarië (thans Malagasy), het grote eiland in de Indische Oceaan tegenover Mozambique, de bakermat van vele andere succulenten.

*K. pumila* wordt slechts 10 cm hoog, de vrij slanke stengels buigen dan om, waarna ze gaan kruipen of hangen. De tegenoverstaande bladeren zitten dicht



Detail bladtop  
vergr. 6,3 x



op elkaar, zijn 2—2,5 cm lang, 1,5 cm breed, eirond en aan de basis wigvormig versmald. Het bovenste deel van de bladrand is gekerfd. Het gehele blad is witmelig berijpt. Door de inwerking van de zon vertonen de bladeren fraaie nuances van roserood tot diep paars. Vroeg in het voorjaar verschijnen de talrijke, violetrode, viertallige bloempjes in trosvormige pluimen van 4—6 cm doorsnee, waardoor een mooi effect ontstaat in combinatie met de fraai gekleurde bladeren. Uiteraard is de plant het mooist in de bloei, maar ook een niet bloeiende plant is een sieraad in de verzameling of op een zonnige vensterbank.

#### **Verzorging**

De verzorging en de vermeerdering scheppen weinig problemen. Kopstek wortelt zeer spoedig in een zandig grondmengsel. Bewortelde stekken kunnen



worden opgepot in een grondbmengsel, bestaande uit gelijke delen blad- of potgrond, scherp zand en rulle klei. Door nog enkele malen de planten te toppen krijgt men bossige, vertakte planten die rijk bloeien. De afgesneden toppen kan men uiteraard weer als stek behandelen. Tijdens de groei verlangt de plant veel zon en frisse lucht. 's Zomers kan men ze bij goed weer buiten kweken, waardoor een stevige groei ontstaat en de bladverkleuring intenser wordt. Bij lang aanhoudende regen moet men ze echter beschermen tegen te veel vocht. Ook uit zaad is *K. pumila* te vermeerderen, maar door de vrij snelle groei van het plantje is stekken gemakkelijker. In de winter moet hij vrij droog en koel (ca. 10°C.) worden gehouden waardoor men een onnatuurlijke groei en bladval voorkomt.

Jonkerlaan 14, Wassenaar

Foto's: Noltee

## Juli/augustus allerlei

Voor juli gelden in grote lijnen dezelfde aanwijzingen als voor juni. Veel luchten en ruim water verstrekken in deze zomerse maand. Echter matig water geven aan de planten uit de moeilijke geslachten, speciaal als deze op eigen wortel gekweekt worden.

Let op niet goed florerende planten, zie juni. Gun uw planten evenwel ook rust. Planten waarmee steeds „gerommeld” wordt, die steeds zonder noodzaak verpot worden en ieder ogenblik een andere standplaats krijgen, hebben niet de gelegenheid om tot volle schoonheid uit te groeien. Planten die een tijdje als het ware vergeten worden, blijken er dan mooier bij te staan dan u verwacht had.

In juli/augustus, afhankelijk van het weer, houden vele planten een korte zomerrust. Als gevolg van de hoge temperaturen stoppen zij tijdelijk a.h.w. een beetje met groeien; een natuurlijke afweer tegen de felle zon en de hitte. Pas de toediening van water bij deze verminderde groeiactiviteit aan.

Niet verpotte grote planten kunnen eens per 14 dagen bemest worden met stikstofarme kunstmest. De Phyllocactussen kunnen we deze bemesting geven in de vorm van slappe gier. Oude koemest of gedroogde koemest uit een zakje, oplossen in water en de Phyllo's hiervan een scheut toedienen.

In augustus worden de dagen al merkbaar korter en afgezien van een eventuele zomerrust, dient het watergeven hieraan aangepast te worden. Augustus is dikwijls een zeer natte maand met drukkend broeierig weer. In zo'n periode kunnen zeer plotseling schimmels optreden als de grond te lang nat blijft. Door het ontbreken van zonneshijn en door het bedompte karakter van het weer, krijgen deze schimmels (zwammen) de kans om tot ontwikkeling te komen, hetgeen weer tot wortel- en wortelhalsrot aanleiding kan geven. Veel luchten dus, zodat de bovenlaag van de grond gelegenheid krijgt te drogen. Dit geldt evenzeer voor de huiskamerkwekers!

Voor de andere succulenten, de vetplanten, geldt in grote trekken hetzelfde als voor de cactussen. Ook de vetplanten houden op het heetst van de zomer een korte rusttijd.

Sommige Conophytums zullen al wat water kunnen verdragen omdat zij eerder aan de groei gaan dan de overige soorten. Bekijk uw Conophytums goed en u zult zien welke soorten beginnen te groeien.

De overige wintergroeiende Mesems zullen pas eind volgende maand tekenen van een nieuwe vegetatieperiode vertonen. Dit geldt overigens ook voor de najaar- en wintergroeiende Crassula-achtigen.

Van de struikmesems kunt u het beste in juli stekken snijden. Ze wortelen dan vóór de herfst, en daarmee de rustperiode, begint.