


## × *Pachyveria* cv. 'Glossoides'

*Pachyveria* (?) *glossoides* Gossot in Notre Vallée  
24/25 : 36 (1938).

Toen wij op een gegeven moment planten, die bij ons als *Pachyveria glossoides* in cultuur waren, identificeerden als *P. 'Clavifolia'*, vermoedden wij nog niet, dat ook de oplossing van dit vraagstuk zo spoedig tot het verleden zou behoren. Door een toeval ontdekten wij verleden jaar in het Succulentarium te Wageningen, dat een plant, daar ontvangen als *Cotyledon glossoides*, bij grondige vergelijking met *P. 'Clavifolia'*, dermate van




Figuur 59

foto: I.V.T.

× *Pachyveria* cv. 'Glossoides'

deze afweek, dat bleek dat wij met een geheel andere plant te doen hadden. De grote vraag was echter of dit inderdaad de door Gossot beschreven *Pachyveria* (?) *glossoides* was. Eerst dit jaar waren wij in staat deze plant met de originele beschrijving te vergelijken, daar wij door de vriendelijke bemiddeling van Dr. B. K. BOOM alle beschrijvingen van Gossot uit bovengenoemd tijdschrift in handen kregen. Hierbij bleek dat deze plant volkomen aan Gossot's beschrijving beantwoordde.

Gossot, die deze plant van een zekere CORBEIL (een kweker?) verkreeg, vermeldt dat deze plant toevallig ontstaan is. Hij twijfelde of dit een geslachtshybride was, vandaar het vraagteken achter de geslachtsnaam.



Figuur 60 foto: I.V.T.  
Bloemstengel van *Pachyveria* cv.  
'Glossoides'

Naar onze mening is dit inderdaad een *Pachyveria*, daar de bloeiwijze typisch *Pachyphytum*-achtig is en de habitus veel overeenkomst vertoont met *P. 'Clavifolia'*, die volgens opgave ook ontstaan is door een geslachtskruising. Ongetwijfeld was een der ouders *Pachyphytum hookeri*, de ander een *Echeveria* sp. Ondanks de oppervlakkige overeenkomst met *Pachyveria 'Clavifolia'* verschilt zij toch duidelijk van deze, hetgeen wij in een vergelijkingstabel nog even verduidelijken.

#### Korte beschrijving :

Rozetten 30 cm of meer lang, aanvankelijk rechtop groeiend, later liggend, spruitend aan de basis van de plant.

Bladen kaal, iets opgebogen, blauw-groen berijpt, 4—6 cm lang, aan de top en basis geleidelijk smaller wordend; toegespitst, met scherp licht gekleurd spitsje; bovenzijde der bladen vlak, onderzijde bol, niet gekield.

Bloeiwijze een 20 cm lange, onvertakte, eenzijdige tros, met ongeveer 15 bloemen; bloemkleur geel- tot roodachtig van buiten, geel van binnen; bloemkroon  $\pm$  14 mm lang en breed, kort gesteeld, bloembladen dik, aan de top weinig teruggebogen, aan de voet der meeldraden met twee schubjes (kenmerk *Pachyphytum*). Vruchtbeginsel geel.

Kelkbladen groot, aanliggend, ongelijkvormig, weinig korter dan de bloemkroon, groen of iets roodachtig. Schutbladen tussen de bloemen groot (12—15 mm), in twee rijen geplaatst, lagere schutbladen klein en verdrogend.

Hier volgt een overzicht van de voornaamste verschillen :

#### P. 'GLOSSOIDES'

Rozet: sterk verlengd,  $\pm$  30 cm lang

Stengel: liggend

Bladvorm: langwerpige-tongvormig, spits, ongekiel

Bladstand: zeer dicht opeen, stengel onzichtbaar

Bloeiwijze: enkelvoudige, eenzijdige tros

Bloem: roodachtig geel,  $\pm$  15 bloemen

Schutbladen: (hogere) groot  
(lagere) klein

#### P. 'CLAVIFOLIA'

kort,  $\pm$  15 cm lang

rechtopstaand

knotsvormig, stomp, gekiel

wijder, stengel zichtbaar

samengestelde, alzijdige tros

karmijnrood,  $\pm$  25 bloemen

klein  
groot

Eigenaardig is het dat ondanks de vele verschillen, die uiteraard vooral bij oudere planten naar voren treden, jonge planten van deze twee cultivars zoveel op elkaar gelijken dat zij gemakkelijk voor één soort aangezien worden.

Andere door Gossot beschreven *Pachyveria* hybriden zijn in Nederland niet, in Zuid-Frankrijk waarschijnlijk wel in cultuur. Wie kan ons aan materiaal helpen?


---

B. K. BOOM en A. M. WOUTERS

## *Pyrrhocactus bulbocalyx* (Werd.) Back.

Dit is een bijzonder mooie soort, niet te groot van stuk, blauwgroen van kleur, regelmatig van vorm, dicht en wit bedoornd. Het lichaam is kogelrond tot eivormig en bestaat uit 10–14 ribben, die verdeeld zijn in grote knobbels, ieder met 10–15 vrij lange (tot 2 cm) harde, stekende, iets gekromde dorens; ze zijn wit tot grijs, soms ook roodachtig.

De bloemen verschijnen in de zomer nabij de top; ze zitten op de areolen vlak boven de inplantingsplaats der dorens en ze hebben het typische urnvormige uiterlijk van *Pyrrhocactus*; de buitenste bloembladen zijn zodanig naar buiten gebogen, dat de bloemvorm uitstekend beantwoordt aan de naam „*bulbocalyx*” (met bolvormige kelk). Het vruchtbegin-



Figuur 61

foto: Wouters

*Pyrrhocactus bulbocalyx* (Werd.) Back., in bloei. Deze foto werd ook gepubliceerd in Backeberg, *Cact.* 6. p. 3744.