

Schoenl., Subsektion *Caryophyllaceae* Schoenl. der Gattung *Cotyledon* L. wurden wegen des abweichenden Blütenbaues (siehe oben) von dieser abgetrennt. SCHÖNLAND wie VON POELLNITZ weisen darauf hin, daß die in *Adromischus* Lem. Sekt. II/2 (wie II/3) untergebrachten Arten eine Zwischenstellung zu *Cotyledon* L. aufweisen (siehe FEDDE Repertorium... XLVIII, 1940, S. 87).

Einteilung der Gattung *Adromischus* Lem. in Sektionen

von Dr. KARL VON POELLNITZ emend. JACOBSEN

Leitart: *Adromischus hemisphaericus* (L.) Lem.

I. Sektion *Brevipedunculati* v. Poelln.

(*Cotyledon* L. Sekt. *Paniculatae* Schoenl. Subsekt. *Caryophyllaceae* Schoenl. p. part.).

Schaft meist kurz, seltener bis 15 cm lang; Blüten zu 1—5, selten bis 10, gestielt, aufrecht; Sproß kurz, selten lang; Pflanzen klein, mit kleinen bis mittelgroßen Blättern.

Leitart: *Adromischus humilis* (Marl.) C. A. Smith

Arten:

- Adromischus antidorcatum* v. Poelln.
- casmithianus* v. Poelln.
- herrei* (Bark.) v. Poelln.
- hoerleinianus* (Dtr.) v. Poelln.
- humilis* (Marl.) C. A. Smith
- pauciflorus* P. C. Hutchis.
- schaeferianus* (Dtr.) Bgr.
- schuldianus* v. Poelln.

Adromischus maximus (rechts) P. C. Hutchis. *Reprod.: Cact. Succ. Journ. Am. XXXI, 1959, S. 131.* Phot. P. C. Hutchison

Adromischus hoerleinianus (unten) (Dtr.) v. Poelln.
Phot. J. Marnier-Lapostolle (Backeberg)



Adromischus marianae (Marl.) Bgr.

Phot. H. Jacobsen

